Plano complexo (plano de Gauss)

- A cada número complexo $z = a + bi$ podemos associar, um e somente um, par ordenado (a, b) .

$$(a, b) \Rightarrow a = \operatorname{Re}(z) \text{ e } b = \operatorname{Im}(z)$$

- A partir dessa correspondência um a um, podemos representar o conjunto dos números complexos por meio de um sistema de coordenadas cartesianas. A esse sistema damos o nome de **plano complexo** ou **plano de Gauss**.

- A cada complexo $z = a + bi$ corresponde, no plano complexo, um ponto $P(a, b)$.

- Veja os afixos de alguns complexos no plano complexo.

Complexo	Afixo
$3 + 2i$	A(3, 2)
$-3 + i$	B(-3, 1)
$-2 - 4i$	C(-2, -4)
$2 - i$	D(2, -1)
$4 = 4 + 0i$	E(4, 0)
$-3i = 0 - 3i$	F(0, -3)
$0 = 0 + 0i$	O(0, 0)

Módulo e argumento de um complexo

- A fim de definir o **módulo e argumento de um complexo** complexo $z = a + bi$, sendo a e b reais.

- ✓ $r = |z| \rightarrow$ módulo de z (OP)
- ✓ $\alpha = \arg(z) \rightarrow$ argumento de z

- A fim **Módulo e argumento de um complexo** complexo $z = a + bi$, sendo a e b reais.

✓ Cálculo de $r = |z|$:

$$r^2 = a^2 + b^2$$

$$r = |z| = \sqrt{a^2 + b^2}$$

- A fim **Módulo e argumento de um complexo** complexo $z = a + bi$, sendo a e b reais.

✓ Cálculo do $\arg(z)$:

$$\cos \alpha = \frac{a}{r}$$

$$\text{sen } \alpha = \frac{b}{r}$$

Exemplos

- Obter o módulo r e o argumento principal α de cada um dos complexos $z = a + bi$ a seguir. Representar seus afijos P no plano de Gauss.

a) $z = -2i \Rightarrow z = 0 - 2i \Rightarrow a = 0$ e $b = -2$

$$r = |z| = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{0^2 + (-2)^2} = 2$$

$$\left. \begin{aligned} \cos \alpha &= \frac{a}{r} = \frac{0}{2} = 0 \\ \text{sen } \alpha &= \frac{b}{r} = \frac{-2}{2} = -1 \end{aligned} \right\} \Rightarrow \arg(z) = \alpha = 270^\circ$$

Exemplos

- Obter o módulo r e o argumento principal α de cada um dos complexos $z = a + bi$ a seguir. Representar seus afijos P no plano de Gauss.

a) $z = -2i$

Exemplos

- Obter o módulo r e o argumento principal α de cada um dos complexos $z = a + bi$ a seguir. Representar seus afijos P no plano de Gauss.

a) $z = -\sqrt{3} + i \Rightarrow a = -\sqrt{3}$ e $b = 1$

$$r = |z| = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{(-\sqrt{3})^2 + 1^2} = 2$$

$$\left. \begin{aligned} \cos \alpha &= \frac{a}{r} = \frac{-\sqrt{3}}{2} \\ \text{sen } \alpha &= \frac{b}{r} = \frac{1}{2} \end{aligned} \right\} \Rightarrow \arg(z) = \alpha = 150^\circ$$

Exemplos

- Obter o módulo r e o argumento principal α de cada um dos complexos $z = a + bi$ a seguir. Representar seus afijos P no plano de Gauss.

a) $z = -\sqrt{3} + i$

Exemplos

- Obter o módulo r e o argumento principal α de cada um dos complexos $z = a + bi$ a seguir. Representar seus afixos P no plano de Gauss.

a) $z = 4 \Rightarrow z = 4 + 0i \Rightarrow a = 4$ e $b = 0$

$$r = |z| = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{4^2 + 0^2} = 4$$

$$\left. \begin{array}{l} \cos \alpha = \frac{a}{r} = \frac{4}{4} = 1 \\ \text{sen } \alpha = \frac{b}{r} = \frac{0}{4} = 0 \end{array} \right\} \Rightarrow \arg(z) = \alpha = 0^\circ$$

Exemplos

- Obter o módulo r e o argumento principal α de cada um dos complexos $z = a + bi$ a seguir. Representar seus afixos P no plano de Gauss.

a) $z = 4$

Forma trigonométrica de um complexo

Forma trigonométrica

- Todo complexo $z = a + bi$ pode ser escrito em função de seu módulo r e de seu argumento principal α . Veja

$$\begin{aligned} \cos \alpha &= \frac{a}{r} \Rightarrow a = r \cos \alpha \\ \text{sen } \alpha &= \frac{b}{r} \Rightarrow b = r \text{sen } \alpha \end{aligned}$$

$$z = a + bi \Rightarrow z = r \cos \alpha + r \text{sen } \alpha \cdot i$$

$$z = r(\cos \alpha + i \text{sen } \alpha)$$

Exemplos

- Representar na forma trigonométrica, os números complexos $x = 1 + \sqrt{3}i$, $y = -3 + 3i$ e $z = 2i$.

$x = 1 + \sqrt{3}i \Rightarrow a = 1$ e $b = \sqrt{3}$

$$r = |z| = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{1^2 + (\sqrt{3})^2} = 2$$

$$\left. \begin{array}{l} \cos \alpha = \frac{a}{r} = \frac{1}{2} \\ \text{sen } \alpha = \frac{b}{r} = \frac{\sqrt{3}}{2} \end{array} \right\} \Rightarrow \arg(z) = \alpha = 60^\circ$$

$$z = 2(\cos 60^\circ + i \text{sen } 60^\circ)$$

Exemplos

- Representar na forma trigonométrica, os números complexos $x = 1 + \sqrt{3}i$, $y = -3 + 3i$ e $z = 2i$.

$x = -3 + 3i \Rightarrow a = -3$ e $b = 3$

$$r = |z| = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{(-3)^2 + 3^2} = 3\sqrt{2}$$

$$\left. \begin{array}{l} \cos \alpha = \frac{a}{r} = \frac{-3}{3\sqrt{2}} = \frac{-\sqrt{2}}{2} \\ \text{sen } \alpha = \frac{b}{r} = \frac{3}{3\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2} \end{array} \right\} \Rightarrow \arg(z) = \alpha = 135^\circ$$

$$z = 3\sqrt{2}(\cos 135^\circ + i \text{sen } 135^\circ)$$

Exemplos

- Representar na forma trigonométrica, os números complexos $x = 1 + \sqrt{3}i$, $y = -3 + 3i$ e $z = 2i$.

$$z = 2i \Rightarrow a = 0 \text{ e } b = 2$$

$$r = |z| = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{(0)^2 + 2^2} = 2$$

$$\left. \begin{array}{l} \cos \alpha = \frac{a}{r} = \frac{0}{2} = 0 \\ \text{sen } \alpha = \frac{b}{r} = \frac{2}{2} = 1 \end{array} \right\} \Rightarrow \arg(z) = \alpha = 90^\circ$$

$$z = 2(\cos 90^\circ + i \text{sen } 90^\circ)$$

Operações na forma trigonométrica

Multiplicação

- Suponhamos dois complexos z e w , escritos na forma trigonométrica:

$$z = r (\cos \alpha + i \text{sen } \alpha) \quad e \quad w = s (\cos \beta + i \text{sen } \beta)$$

$$z \cdot w = rs [\cos (\alpha + \beta) + i \text{sen } (\alpha + \beta)]$$

Observe que:

- ✓ $|z \cdot w| = rs = |z| \cdot |w|$
- ✓ $\arg(z \cdot w) = \alpha + \beta = \arg(z) + \arg(w)$

Exemplos

- O produto de $z = 2(\cos 112^\circ + i \text{sen } 112^\circ)$ por $w = 3(\cos 68^\circ + i \text{sen } 68^\circ)$ é

$$z \cdot w = 2 \cdot 3 [\cos (112^\circ + 68^\circ) + i \text{sen } (112^\circ + 68^\circ)]$$

$$= 6 (\cos 180^\circ + i \text{sen } 180^\circ)$$

$$= 6 (-1 + 0i) = -6$$

Exemplos

- O produto de $x = 4(\cos 80^\circ + i \text{sen } 80^\circ)$ por $y = \cos 40^\circ + i \text{sen } 40^\circ$ é

$$x \cdot y = 4 \cdot 1 [\cos (80^\circ + 40^\circ) + i \text{sen } (80^\circ + 40^\circ)]$$

$$= 4 (\cos 120^\circ + i \text{sen } 120^\circ)$$

$$= 4 \left(\frac{-1}{2} + i \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \right) = -2 + 2\sqrt{3}i$$

Divisão

- Suponhamos, novamente, dois complexos z e w , com $w \neq 0$, escritos na forma trigonométrica:

$$z = r (\cos \alpha + i \text{sen } \alpha) \quad e \quad w = s (\cos \beta + i \text{sen } \beta)$$

$$z/w = r/s [\cos (\alpha - \beta) + i \text{sen } (\alpha - \beta)]$$

Observe que:

- ✓ $|z/w| = r/s = |z| / |w|$
- ✓ $\arg(z/w) = \alpha - \beta = \arg(z) - \arg(w)$

Exemplos

- Na divisão de $z = 6(\cos 20^\circ + i \sin 20^\circ)$ por $w = 3(\cos 65^\circ + i \sin 65^\circ)$, o quociente é

$$\begin{aligned} z/w &= 6/3 [\cos (20^\circ - 65^\circ) + i \sin (20^\circ - 65^\circ)] \\ &= 2 [\cos (-45^\circ) + i \sin (-45^\circ)] \\ &= 2 (\cos 315^\circ + i \sin 315^\circ) \\ &= 2 \left(\frac{\sqrt{2}}{2} - i \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \right) = \sqrt{2} - \sqrt{2}i \end{aligned}$$

Potenciação

- Se $z = r(\cos \alpha + i \sin \alpha)$, vamos obter o módulo e o argumento da potência z^3 .

$$\begin{aligned} z^3 &= z \cdot z \cdot z \\ |z^3| &= |z \cdot z \cdot z| = |z| \cdot |z| \cdot |z| = r \cdot r \cdot r = r^3 \\ \arg(z^3) &= \arg(z \cdot z \cdot z) = \arg(z) + \arg(z) + \arg(z) \\ &= \alpha + \alpha + \alpha = 3\alpha = 3\arg(z) \end{aligned}$$

$$z^3 = r^3(\cos 3\alpha + i \sin 3\alpha)$$

Potenciação - Regra geral

- Se $z = r(\cos \alpha + i \sin \alpha)$, temos

$$z^k = r^k(\cos k\alpha + i \sin k\alpha)$$

(1ª fórmula de De Moivre)

Observe que:

- ✓ $|z^k| = r^k = |z|^k$
- ✓ $\arg(z^k) = k \cdot \alpha = k \cdot \arg(z)$

Exemplos

- Se $z = 2(\cos 15^\circ + i \sin 15^\circ)$, calcular z^6 .

$$\begin{aligned} z^6 &= 2^6 [\cos (6 \cdot 15^\circ) + i \sin (6 \cdot 15^\circ)] \\ &= 64 (\cos 90^\circ + i \sin 90^\circ) \\ &= 64 (0 + i) \\ &= 64i \end{aligned}$$

$$z^6 = 64i$$

Exemplos

- Pela fórmula de De Moivre, calcular $(1 - i)^{-9}$.

Vamos escrever $z = 1 - i$ na forma trigonométrica.

$$z = 1 - i \Rightarrow a = 1 \text{ e } b = -1$$

$$r = |z| = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{(1)^2 + (-1)^2} = \sqrt{2}$$

$$\left. \begin{aligned} \cos \alpha \frac{a}{r} &= \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2} \\ \sin \alpha \frac{b}{r} &= \frac{-1}{\sqrt{2}} = \frac{-\sqrt{2}}{2} \end{aligned} \right\} \Rightarrow \arg(z) = \alpha = 315^\circ$$

$$z = \sqrt{2}(\cos 315^\circ + i \sin 315^\circ)$$

Exemplos

- Pela fórmula de De Moivre, calcular $(1 - i)^{-9}$.

Pela fórmula de De Moivre,

$$\begin{aligned} z^{-9} &= (\sqrt{2})^{-9} [\cos (-9 \cdot 315^\circ) + i \sin (-9 \cdot 315^\circ)] \\ &= \sqrt{2} \cdot 2^{-5} [\cos (-2835^\circ) + i \sin (-2835^\circ)] \\ z^{-9} &= \frac{\sqrt{2}}{32} (\cos 45^\circ + i \sin 45^\circ) \\ &= \frac{\sqrt{2}}{32} \left(\frac{\sqrt{2}}{2} + i \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \right) = \frac{1}{32} + \frac{1}{32}i \end{aligned}$$

Raízes de um complexo

- Considere os resultados complexos, escritos na forma algébrica

$$w_1 = 3 \quad w_2 = -3 \quad w_3 = 3i \quad w_4 = -3i$$

Vamos calcular a quarta potência de todos eles.

$$(w_1)^4 = 3^4 = 81$$

$$(w_2)^4 = (-3)^4 = 81$$

$$(w_3)^4 = (3i)^4 = 81 \cdot i^4 = 81$$

$$(w_4)^4 = (-3i)^4 = 81 \cdot i^4 = 81$$

Dizemos que cada um desses quatro números é uma **raiz quarta** de 81.

- **Generalizando**, se z é um número complexo e $n \geq 2$, n natural,

$$w^n = z \Rightarrow w \text{ é uma raiz } n\text{ésima de } z$$

Exemplo

- Utilizando a forma trigonométrica, obter as raízes cúbicas de $z = 8$.

Vamos escrever $z = 8$ na forma trigonométrica.

$$z = 8(\cos 0^\circ + i \operatorname{sen} 0^\circ)$$

Devemos encontrar todos os complexos w ; $w^3 = z = 8$.

$$w = s(\cos \beta + i \operatorname{sen} \beta) \Rightarrow w^3 = s^3(\cos 3\beta + i \operatorname{sen} 3\beta)$$

$$w^3 = z \Rightarrow s^3(\cos 3\beta + i \operatorname{sen} 3\beta) = 8(\cos 0^\circ + i \operatorname{sen} 0^\circ)$$

$$\begin{cases} s^3 = 8 \Rightarrow s = 2 \\ \cos 3\beta = \cos 0^\circ \text{ e } \operatorname{sen} 3\beta = \operatorname{sen} 0^\circ \end{cases}$$

Exemplo

- Utilizando a forma trigonométrica, obter as raízes cúbicas de $z = 8$.

O co-seno é 1 e o seno é 0 na origem A do ciclo.

$$\begin{cases} \cos 3\beta = 1 \\ \operatorname{sen} 3\beta = 0 \end{cases} \Rightarrow 3\beta = k \cdot 360^\circ \Rightarrow \beta = k \cdot 120^\circ$$

$$\begin{aligned} \checkmark k = 0 &\Rightarrow \beta = 0^\circ \\ \checkmark k = 1 &\Rightarrow \beta = 120^\circ \\ \checkmark k = 2 &\Rightarrow \beta = 240^\circ \end{aligned}$$

Exemplo

- Utilizando a forma trigonométrica, obter as raízes cúbicas de $z = 8$.

As três raízes cúbicas de $z = 8$ são

$$\checkmark w_1 = 2(\cos 0^\circ + i \operatorname{sen} 0^\circ)$$

$$\checkmark w_2 = 2(\cos 120^\circ + i \operatorname{sen} 120^\circ)$$

$$\checkmark w_3 = 2(\cos 240^\circ + i \operatorname{sen} 240^\circ)$$

- Veja a fórmula para o cálculo das raízes enésimas de um complexo.

Dado o complexo na forma polar $z = r(\cos \alpha + i \operatorname{sen} \alpha)$

$$z_n = \sqrt[n]{r} \left(\cos \frac{360^\circ \cdot k + \alpha}{n} + i \operatorname{sen} \frac{360^\circ \cdot k + \alpha}{n} \right)$$